

Formulario CRA para

adultos y niños mayores de 6 años

Guía de cuatro pasos para la prevención de caries

Nombre _____

Fecha _____



Descubrimiento de riesgos y enfermedades

Complete la sección a continuación marcando con un círculo la respuesta apropiada para cada pregunta.

PACIENT USE	Factores de riesgo		
	SALIVA		
	¿Toma medicamentos diariamente? De ser así, ¿cuántos?	NO	SÍ (_____)
	¿Siente que tiene la boca seca en algún momento del día o de la noche?	NO	SÍ
	DIETA		
	¿Bebe líquidos que no sean agua más de 2 veces al día entre comidas?	NO	SÍ
	¿Come tentempiés entre comidas?	NO	SÍ
	BIOPELÍCULA		
	¿Nota la acumulación de placa en los dientes entre un cepillado y el siguiente?	NO	SÍ
	CLINICIAN USE ONLY	Resultados de la lectura de CariScreen:	BAJA (0-1500)
Indicadores de enfermedad			
¿Tiene alguna cavitación visible nueva o en progreso?		NO	SÍ
¿Tiene alguna radiotransparencia interproximal nueva o en progreso?		NO	SÍ
¿Tiene descalcificaciones nuevas o activas?		NO	SÍ
	¿Tiene antecedentes de caries?	NO	SÍ



Identificación del riesgo

El riesgo se determina basándose en las respuestas anteriores; una respuesta azul indica un riesgo moderado, una respuesta roja indica un riesgo alto.

Saludable	+ Factores de riesgo	+ Indicadores de enfermedad
1 - Riesgo bajo	2 - Riesgo moderado	3 - Riesgo alto
Código CDT D0601	Código CDT D0602	Código CDT D0603

Una vez que se haya realizado el diagnóstico del nivel de riesgo, consulte la página siguiente para conocer las opciones de tratamiento y el protocolo de reevaluación.

Formulario de evaluación del riesgo de caries (CRA)

Guía de cuatro pasos para la prevención de caries



Opciones de tratamiento

1 - Riesgo bajo	2 - Riesgo moderado	3 - Riesgo alto
 <p>Gel 1100 o PRO Gel 5000</p>	 <p>Enjuague de mantenimiento y PRO Gel 5000 (o kit de mantenimiento de 3 meses)</p>	 <p>Enjuague de tratamiento y PRO Gel 5000 (o kit de tratamiento de 3 meses)</p>

Ressequedad de la boca

Si se ha realizado un diagnóstico de boca seca o si la respuesta a la pregunta sobre la boca seca es sí, se recomienda usar productos hidratantes como Spray, mentas para el aliento o gel sin flúor a lo largo del día.



Protocolo de reevaluación

Riesgo alto: Reevaluar cada tres meses hasta que el riesgo baje a moderado.

Riesgo moderado: Reevaluar en cada cita hasta que el riesgo sea bajo.

Riesgo bajo: Reevaluar anualmente.

Guía de cuatro pasos para la prevención de caries

